

## FICHA TECNICA MUSCLE UP

TENSOR MUSCULAR QUE ACTUA COMO UN NUTRIENTE CELULAR, CONTIENE INSTRUCCIONES PARA RESTABLECER FUNCIONES ESPECIFICAS, COMBINACION UNICA DE ACTIVOS CON UNA POTENTE ACCION DIRECTAMENTE EN LOS MUSCULOS DANDO UN RESULTADO INMEDIATO DE TENSOR MUSCULAR, AUMENTO MUSCULAR MEJORANDO LA ESTRUCTURA DE SUS FIBRAS.

### BENEFICIOS DE LA LINEA:

- LEVANTA Y REAFIRMA ZONAS COMO MUSCULO FEMORAL, BICEPS Y MUSCULOS DE LOS BRAZOS.
- TONIFICA Y REGENERA EL TEJIDO MUSCULAR QUE POR CAUSA DE ENFERMEDAD O DAÑO SE ENCUENTRA DISMINUIDO.
- MEJORA LA ELASTICIDAD DE PIEL DANDO UN EFECTO DE TENSADO.

### ACTIVOS PRINCIPALES:

#### - SILICIO ORGÁNICO

**ACCION:** POSEE PROPIEDADES RESTRUCTURANTÉS, QUE LO HACEN UN PODEROSO REAFIRMANTE ANTIESTRÍAS.

#### - VITAMINA C AL 20%

**ACCION:** ES EL ACTOR PRINCIPAL EN TRATAMIENTOS PARA REAFIRMAR Y TONIFICAR. TAMBIÉN TIENE UN GRAN EFECTO HIDRATANTE Y ES EFECTIVO CONTRA LAS ESTRÍAS.

#### - SISTEMA DMAE

**ACCION:** ES UN COMPLEJO PRODUCIDO PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE LA EDAD EN LA PIEL. PROMUEVE LA TONICIDAD CUTÁNEA, REFUERZA LOS TEJIDOS Y REDUCE LA FLACIDEZ.

### TRATAMIENTO:

SE INFILTRA DE 5 A 10 ML, POR GLUTEO SEGÚN LO DECIDA EL ESPECIALISTA Y ES DIRECTAMENTE INTRAMUSCULAR.

**RECOMENDACIONES:**

ANTES DE APLICAR EL PROTOCOLO, ES IMPORTANTE QUE REALICES POR LO MENOS TRES SESIONES DE MASAJES EN TUS GLÚTEOS, ESTO AYUDARÁ A REMOVER LA GRASA Y PREPARARÁ AL MUSCULO PARA LAS INYECCIONES.

LUEGO DE CADA INYECCIÓN, PERMITE QUE EL MUSCULO REPOSE DURANTE DOS DÍAS, PARA QUE PUEDA TENER UNA COMPLETA ABSORCIÓN DE LAS VITAMINAS, ESTO ANTES DE REALIZAR RUTINAS DE EJERCICIOS.

**COMPLEMENTE CON:**

APLICAR COMPRESAS FRÍAS EN GLÚTEOS.

REALIZAR MASAJES DE MOLDEAMIENTO EN LAS PIERNAS Y GLÚTEOS (MADEROTERAPIA).

REALIZAR EJERCICIOS PARA TONIFICAR GLÚTEOS.

**ZONAS QUE SE SUELEN TRATAR:** GLÚTEOS, INTERIOR DE LOS MUSLOS, ZONA PERIUMBILICAL, ABDOMEN (ESTRÍAS) Y ZONA INTERIOR ANTEBRAZO Y MUSLOS.

**DESPUÉS DEL TRATAMIENTO EVITAR:**

TEMPERATURAS EXTREMAS: SAUNAS.


EXPOSICIÓN DIRECTA AL SOL O UV.

**POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS:**

DOLOR, ENROJECIMIENTO, EQUIMOSIS, SENSACIÓN DE PICADURA E HINCHAZÓN, INFLAMACIÓN LOCAL, LOS CUALES DESAPARECEN NORMALMENTE EN 24 HORAS.

**CONTRAINDICACIONES:**

ENFERMEDADES O INFECCIONES DE LA PIEL.



EMBARAZO O LACTANCIA.